

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 12-7-73 549780

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG-CEDEX

Supplément n° 1 au Bulletin n° 154 du mois de Juillet 1973

11 Juillet 1973

ARBRES FRUITIERS

- POMMIER - POIRIER -

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le vol des papillons de la génération hivernante est sur le point de se terminer dans nos élevages. La fin de ce premier vol est confirmée par les observations faites en verger par piégeage sexuel.

Les papillons ayant une durée de vie pouvant dépasser 15 à 20 jours, de nouvelles sont et vont être déposées sur feuilles et sur fruits. Afin d'assurer une bonne protection des vergers contre ce ravageur, le renouvellement du traitement insecticide devra être effectué en fin de semaine et au plus tard avant le 17 Juillet.

Nous rappelons que l'emploi des produits à base d'arsenic est interdit sur arbres fruitiers. Le Tuzet est également interdit d'emploi.

PETITS FRUITS

- CASSISSIER -

OIDIUM AMERICAIN

Après la cueillette, prévoir un nouveau traitement contre l'Oïdium américain.

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Le deuxième vol est amorcé depuis quelques jours. Il est, évidemment, trop tôt pour intervenir.

Nous attirons l'attention des viticulteurs sur le fait que l'addition d'un insecticide à la bouillie, à chaque traitement Mildiou, est une absurdité.

La Station définira, le moment venu, l'époque où le traitement trouvera toute son efficacité.

.../...

GRANDES CULTURES

- POMMES DE TERRE -

MILDIOU

Depuis le dernier traitement, le Mildiou n'a pas trouvé de conditions favorables à son développement. De ce fait, l'état sanitaire des cultures est généralement très satisfaisant.

Il sera donc possible d'arrêter les traitements sur les variétés hâtives devant être récoltées avant le 20 Juillet.

Sur les variétés mi-hâtives et tardives, nous conseillons cependant, de renouveler le traitement, car même en absence de pluie, les fortes rosées sont, sous nos climats, suffisantes pour déclencher des contaminations.

Dans le département des VOSGES, où de gros orages ont éclaté, ce traitement sera à effectuer de toute urgence.

DORYPHORE

Dans bien des champs de pommes de terre il semble que le traitement contre les Doryphores ait été négligé.

Nous précisons que la lutte contre les Doryphores est obligatoire et que des poursuites peuvent être engagées.

- HOUBLON -

MILDIOU

En cette période de floraison des houblons, il importe d'être très vigilant malgré les conditions climatiques apparemment peu favorables à la maladie.

Des orages locaux pouvant intéresser la zone houblonnière, un nouveau traitement devra être effectué dans les meilleurs délais.

CULTURES MARAICHÈRES

- TOMATE -

MILDIOU

Sur les cultures de plein champ, poursuivre la protection des tomates contre le Mildiou. Intervenir au cours de ces prochains jours.

- CHOU -

PIERIDE DU CHOU

Les chenilles de la Piéride du chou commencent à être actives. Si un traitement devenait nécessaire, employer :

- Malathion : 75 g/hl, parathions : 25 g/hl ou phosalone : 60 g/hl. (Doses exprimées en matière active).

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Bulletin n° 154 du mois de Juillet publié le 5 Juillet 1973.